

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

ANNEE 1959

N°

THESE

305

POUR LE

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

PAR

DINER Née SERVI-~~OZ~~ Hélène

Née le 4 Juin 1926 à PARIS

=====
Présentée et soutenue publiquement le
=====

LES PERICARDITES AVEC EPANCHEMENTS

REMARQUES CLINIQUES

SUR LES DIFFICULTES DE LEUR DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

à PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS

Président : Monsieur le Professeur DEPARIS

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

ANNEE 1959

N°

THESE

POUR LE

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

PAR

DINER Née SERVI-0Z Hélène

Née le 4 Juin 1926 à PARIS

Présentée et soutenue publiquement le



LES PERICARDITES AVEC EPANCHEMENTS

REMARQUES CLINIQUES

SUR LES DIFFICULTES DE LEUR DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

à PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS

Président : Monsieur le Professeur DEPARIS

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. BENARD (H.), BROCC (P.), BULLIARD (H.), CADENAT (F.), CHABROL (Et.), CHAMPY (C.), CHEVALLIER (P.)
 DEBRE (R.), DONZELIOT (E.), GASTINEL (P.), GUILLAIN (G.), HALPHEN (E.), HARVIER (P.), HAZARD (R.),
 HEUYER (G.), LAROCHE (G.), LAUBRY (Ch.), LEMAITRE (F.), LEVY-SOLAL (E.), LHERMITTE (J.), LEAN (C.),
 LOEPER (M.), MARION (G.), MATHIEU (P.), MOCQUOT (P.), MONDOR (H.), MONOD (R.), MULON (P.),
 OLIVIER (E.), RICHET (Ch.), STROHL (A.), TANON (L.), VELTER (E.)

DOYEN Léon BINET
 Membre de l'Institut

ASSESEUR Jean VERNE.

I.- PROFESSEURS ;

Anatomie

Anatomie pathologique

Anesthésiologie

Bactériologie

Biochimie médicale

Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports

Biologie médicale

Cancérologie médicale et sociale

Clinique carcinologique

Clinique de cardiologie

Cliniques chirurgicales :

Beaujon
 Cochin
 Hôtel-Dieu
 Salpêtrière

Clinique chirurgicale réparatrice et orthopédique

Clinique de chirurgie cardio-vasculaire

Clinique de chirurgie infantile et orthopédie

Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire

Clinique génétique médicale

Clinique gynécologique

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques

Clinique des maladies des enfants

Clinique des maladies infectieuses

Clinique des maladies mentales et de l'encéphale

Clinique des maladies métaboliques

Clinique des maladies du sang

Clinique des maladies du système nerveux

Cliniques médicales

Bichat
 Broussais
 Cochin
 Hôtel-Dieu

Clinique médicale d'hydro-climatologie thérapeutique

Clinique médicale propédeutique

Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies
 de la nutrition

MM.

CORDIER (G.)

DELARUE (A.)

BAUMANN (J.)

FASQUELLE (R.)

JAYLE (M.F.)

CHAILLEY-BERT (P.)

FAUVERT (R.)

BERNARD (J.)

REDON (H.)

MOUQUIN (M.)

SICARD (A.)

QUENU (J.)

MENEGAUX (G.)

MOULONGUET (P.)

MERLE d'AUBIGNE (R.)

de GAUDART-d'ALLAINES (F.)

FEVRE (M.)

MATHÉY (J.)

LAMY (M.)

FUNCK-BRENTANO (P.)

DEGOS (R.)

CATHALA (J.)

MOLLARET (P.)

DELAY (J.)

HAMBURGER (J.)

MARCHAL (G.)

ALAJOUANINE (T.)

JUSTIN-BESANÇON (L.)

de GENNES (L.)

MOREAU (R.)

BARIETY (M.)

DEBRAY (C.)

PASTEUR VALLERY-RADOT (L.)

BOULIN (R.)

Clinique de neuro-chirurgie

Cliniques obstétricales

{ Baudelocque
Port-Royal
Ternier

Clinique ophtalmologique

Clinique oto-rhino-laryngologique

Clinique de pédiatrie sociale

Clinique de pneumo-phthisiologie

Clinique psychiatrique infantile

Clinique de puériculture

Clinique rhumatologique médicale et sociale

Clinique stomatologique

Clinique thérapeutique chirurgicale

Clinique thérapeutique médicale

Clinique urologique

Electrophysiologie médicale (chaire à titre personnel)

Embryologie

Histoire de la médecine et de la chirurgie

Histologie

Hygiène et clinique de la première enfance

Hygiène et médecine préventive

Médecine légale

Médecine du Travail

Parasitologie

Pathologie chirurgicale

Pathologie exotique

Pathologie expérimentale et comparée

Pathologie humorelle et immunologie expérimentale (chaire à titre personnes)

Pathologie médicale

Pathologie et thérapeutique générales

Pharmacologie et matière médicale

Physiologie

Physique médicale

Radiologie médicale

Technique chirurgicale

Thérapeutique

MM.

PETIT-DUTAILLES (D.)

LACOMME (M.)

VARANGOT (J.)

LANTUEJOUL (P.)

RENARD (G.)

AUBIN (A.)

MARIE (J.)

BERNARD (E.)

MICHAUX (L.)

LELONG (M.)

COSTE (F.)

DECHAUME (M.)

SENEQUE (J.)

LEMAIRE (A.)

FEY (B.)

DJOURNO (A.)

GIROUD (A.)

SOULIE (P.)

VERNE (J.)

TURPIN (R.)

JOANNON (C.)

PIEDELIEVRE (R.)

DESOILLE (H.)

GALLIARD (H.)

COUVELAIRE (R.)

LAVIER (G.)

LENEGRE (J.)

MERKLEN (F.)

DECOURT (J.)

GARCIN (J.)

CHEYMOL (J.)

BINET (L.)

DOGNON A.

DESGREZ (H.)

PATEL (J.)

BROUET (G.)

II.- PROFESSEURS SANS CHAIRE. PROFESSEURS AGREGES

ET MAITRES DE CONFERENCES - AGREGES.

Anatomie

Anatomie pathologique

MM.

DELMAS (A.) pr. s. ch.

CABROL (C.)

DEBEYRE (J/)

OLIVIER (G.)

GAUTHIER-VILLARS (Melle P.)

BUSSIER (F.)

GOUYGOU (Ch.)

Anesthésiologie

Bactériologie

Biochimie médicale

Bio logie médicale

Carcinologie

Dermato-Syphiligraphie

Electro-Radiologie

Embryologie

Hématologie

Histologie

Hydrologie

Hygiène

Maladies Infectieuses

Médecine légale

Médecine du Travail

Neuro-chirurgie

Neurologie

Obstétrique

Ophthalmologie

Orthopédie

Oto-rhino-laryngologie

Parasitologie

Pathologie chirurgicale

MM.

N... N...

HAUDUROY (P.) pr.s.mh. (dét.)

NEVOT (A.) pr.s.ch.

CHRISTOL (D.)

TOURNIER (P.)

BARBIER (P.)

ETTORI (J.) pr.s.ch. (dét.)

DESGREZ (P.) pr. s. ch.

POLONOVSKI (J.)

SCHAPIRA (G.)

BOURLIERE (F.)

N... N...

DUPERRAT (B.)

N...

TUCHMANN-DUPIESSIS (H.)

N... N...

COUJARD (R.) pr.s.ch.

N....

N....

CORNET (A.)

BOYER (J.) pr.s.ch.

DEPARIS (M.) pr. s. ch.

BASTIN (R.)

DEROBERT (L.) pr.s.ch.

GAULTIER (M.)

HADENGUE (A.)

ALBAHARY (C.)

DAVID (M.)

LHERMITTE (F.)

GRASSET (J.)

LE LORIER (G.)

LEPAGE (F.)

MERGER (R.)

MORIN (P.)

RAVINA (J.)

ROBEY (M.)

BREGEAT (P.)

DESIGNES (P.)

JUDET (R.)

AUBRY (M.)

MADURO (P.)

BRUMPT (L.C.) pr.s.ch.

CHABAUD (A.)

RUDIER (J.) pr.s.ch. (dét.)

ABOULKER (P.)

BARCAT (J.)

CAUCHOIX (J.)

DUBOST (C.)

FAUREL (J.)

Pathologie chirurgicale

Pathologie expérimentale

Pathologie médicale

Pédiatrie

Pharmacologie

Physiologie

Physique médicale

Pneumo-Phtisiologie

Psychiatrie

Psychiatrie infantile

Rhumatologie

MM.

FLABEAU (F.)

GERMAIN (P.)

GOSSET (J.)

LAURENCE (G.)

LORTAT-JACOB (J.)

OLIVIER (Cl.)

POILLEUX (F.)

THOMERET (G.)

VERNE J.M.

N... N.;...

LOEPER (J.)

MAURICE (P.)

HAGUENAU (J.) pr.s.ch.

BOUDIN (G.)

BOUVIER (J/B.)

BRICAIRE (H.)

BRISSAUD (H.)

CASTAIGNE (P.)

CONTE (M.)

DEROT (M.)

DOMART (A.)

LAMOTTE (M.)

LAROCHE (C.P.)

MACREZ (Cl.)

MILLIEZ (P.)

PEQUIGNOT (H.)

PAMBERT (P.)

ROYER (P.)

THIEFFRY (St.)

TURIAF (J.)

WOLFROMM (R.)

N....

N....

JOSEPH (R.)

MOZZICONACCI (P.)

POLONOVSKY (Cl.)

LEVY (Melle J.) pr.s.ch.

N....

BARJETON (D.) pr.s.ch.

PARROT (J.) pr.s.ch.

DEJOURS (P.)

GOUGEROT (L.)

N....

KREIS (B.)

PICHT (P.)

N...

DELBARRE (F.)

Stomatologie

Thérapeutique

Urologie

MM.

{ CERNEA (P.)
CHAPUT (Mme. A.)
CHASSAGNE (P.)
PERRAULT (M.)
KUSS (R.)

III.- PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES

CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE

à titre permanent.

Clinique chirurgicale

Clinique médicale

Clinique neurologique

Clinique obstétricale

Clinique ophtalmologique

Clinique pédiatrique

Clinique psychiatrique

MM.

{ AMELINE (A.)
HUGUIER (J.)
LEGER (L.)
PADOVANI (P.)
ROUX (M.)
DREYFUS (Gilbert)
KOURILSKY (R.)
de SEZE (S.)
MAYER (H.)
OFFRET (G.)
LAPLANE (R.)
BARUK (H.)

Secrétaire général de la Faculté
Secrétaire

M. MOREL (J.)
Melle CHAINTREUIL (G.)

Conservateur, chargé de la direction
Conservateurs

Bibliothécaires

M. le Docteur HAHN (A.)
Melles DUMAITRE (P.), GOICHON (A.M.)
{ Mme CONTET (J.), Miles LAURENT (H.)
LE NOIR (G.), QUIEVREUX (E.)

Par délibération en date du 9 Décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550417_0016

A MON PERE,

A MA MERE,

A MON MARI,

A MES ENFANTS

A TOUTE MA FAMILLE

A MON PRESIDENT DE THESE :

Monsieur le Professeur D E P A R I S
Professeur à la Faculté de Médecine de P A R I S ,
Médecin des Hôpitaux,

Depuis le temps où nous avons eu le grand honneur d'être son élève,
il nous a fait profiter de son précieux enseignement et nous a toujours
accueillie avec une grande bienveillance dans son service,

Il nous confie le sujet de cette thèse, qu'il veut bien aujourd'hui
nous faire l'honneur de présider,

Qu'il trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance,

A Monsieur le Docteur G O U Y E N
Chef de Service à l'Hopital Saint-Joseph,

A Monsieur le Docteur B O U V I E R,
Assistant à l'Hôpital Saint-Joseph,

Qui m'ont initiée à la Pédiatrie,

EN TEMOIGNAGE DE GRATITUDE .

A l'occasion de deux observations relevées dans le Service de Monsieur le Professeur DEPARIS, il nous a été donné d'insister sur les difficultés posées tant par le diagnostic positif que différentiel ou étiologique des Péricardites :

Il est une notion importante dans ce domaine : celle de la difficulté de leur diagnostic clinique. En effet, leur traduction séméiologique est souvent discrète et variable. La Radiologie et l'Electrocardiographie sont d'un grand appoint tant dans la caractérisation que dans le diagnostic différentiel, mais le problème n'en demeure pas moins ardu. Il se complique encore lorsque l'on aborde leur étiologie dont de nombreux éléments seront fournis par l'interrogatoire et par l'existence de signes concomitants.

Dans les lignes qui suivent, nous avons observé le plan suivant :

1° - OBSERVATIONS :

pages :

Premier malade : Jean FL ...	29 ans	3
Second malade : Emile Ca ...	48 ans	7

2° - DIAGNOSTIC POSITIF :

Données cliniques	15
Données radiologiques	18
Données électriques	19
La ponction du péricarde	20

3° - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

Les formes douloureuses feront discuter :	
- une embolie	
- un Infarctus du myocarde	21
Les formes avec dyspnée et gros cœur feront discuter essentiellement :	21
- la dilatation cardiaque	
Les formes avec dyspnée et douleur thoracique conduiront à éliminer :	21
- un pneumothorax spontané	
- une pneumopathie aiguë	
- une pleurésie aiguë	

4° - DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :

- Péricardite tuberculeuse	22
- Péricardite rhumatismale	23
- Péricardite aiguë bénigne	24

5° - CONCLUSIONS

30

6° - BIBLIOGRAPHIE

31

§ 104. The following provisions shall apply to the

§ 105. The following provisions shall apply to the

§ 106. The following provisions shall apply to the

§ 107. The following provisions shall apply to the

§ 108. The following provisions shall apply to the

§ 109. The following provisions shall apply to the

§ 110. The following provisions shall apply to the

§ 111. The following provisions shall apply to the

§ 112. The following provisions shall apply to the

§ 113. The following provisions shall apply to the

§ 114. The following provisions shall apply to the

§ 115. The following provisions shall apply to the

PREMIERE OBSERVATION

Monsieur FL ... Jean, âgé de 29 ans, entre dans le service le 22 Mai 1958 pour un épanchement pleural bilatéral avec dyspnée paroxystique fébrile.

Il n'existe aucun antécédent de Rhumatisme Articulaire, ni Baccillaire; pas d'épisode grippal, pas d'angine dans les jours précédents.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Les troubles débutent brusquement le 11 Mai 1958 par une sensation d'oppression thoracique avec dyspnée, sans douleur. La température est à 38°C. L'examen clinique ne montre rien d'anormal. Le malade est vu à la radioscopie qui ne révèle rien, aussi reprend-il son activité le lendemain.

Le 20 Mai 1958, apparition d'un épisode identique avec fièvre à 38°5, mais la dyspnée est plus intense, douloureuse; le malade est fatigué. A l'examen, on découvre une matité des deux bases, plus importante à gauche. Jean FL ... est hospitalisé le 22 Mai 1958.

A L'EXAMEN, à l'entrée, le 22 Mai 1958, on se trouve en présence d'un malade pâle, en mauvais état général, très dyspnéique; la température est à 39°C et l'on note :

- tension artérielle : 13 - 8
- coeur rapide à 95 pulsations par minute
- un bruit anormal est entendu à la base du coeur, bruit très variable, peu intense, plus nettement entendu en apnée et dont il est difficile de préciser s'il est orificiel ou péricardique.
- les bruits assourdis
- une matité des deux bases, plus importante à gauche

Le lendemain, 23 Mai 1958, l'examen précise :

- l'épanchement pleural bilatéral diminue d'abondance, sans souffle pleurétique, mais avec quelques râles sus-jacents;

- d'autre part, une augmentation de l'aire de la matité cardiaque et surtout un frottement péricardique, très intense, siégeant dans toute la région précordiale.

... of the

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

1990

- le coeur est sourd, régulier, rapide; la tension artérielle demeure à 13 - 8.

- Par ailleurs, l'examen complet est négatif :

abdomen : R.A.S.

gorge : R.A.S.

Aucune manifestation articulaire

La Radiographie montre :

- un coeur volumineux, triangulaire débordant largement à droite.
- un pédicule vasculaire élargi, raccourci,
- une opacité liquidienne de la base gauche,
- un comblement du cul-de-sac diaphragmatique droit, surmonté d'une opacité non homogène.

A l'électrocardiographie :

- il n'y a pas d'altération du segment PR
- dans les dérivations standards, on a :
 - une sous-dénivellation légère de ST
 - en D₁, une onde T aplatie
 - en D₂ D₃, un T négatif
- dans les dérivations précordiales, on note :
 - une sous-dénivellation de ST
 - un T négatif de V₂ à V₆

L'examen du sang fournit les renseignements suivants :

- Numération : 23.000 globules blancs, dont 87 % de polynucléaires
4,520.000 globules rouges
- la vitesse de sédimentation est accélérée : 60 - 100 - 120 minutes
- la fibrine est à 12, 60 g
- les α_2 globulines sont augmentées
- les antistreptolysines: 240 U

L'examen du prélèvement de gorge ne montre rien d'anormal

Le dosage d'urée : 0.15 g.

BORDET-WASSERMANN : négatif

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. The second part is devoted to a detailed analysis of the case.

3. The third part is devoted to a detailed analysis of the case.

4. The fourth part is devoted to a detailed analysis of the case.

5. The fifth part is devoted to a detailed analysis of the case.

6. The sixth part is devoted to a detailed analysis of the case.

7. The seventh part is devoted to a detailed analysis of the case.

8. The eighth part is devoted to a detailed analysis of the case.

9. The ninth part is devoted to a detailed analysis of the case.

10. The tenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

11. The eleventh part is devoted to a detailed analysis of the case.

12. The twelfth part is devoted to a detailed analysis of the case.

13. The thirteenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

14. The fourteenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

15. The fifteenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

16. The sixteenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

17. The seventeenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

18. The eighteenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

19. The nineteenth part is devoted to a detailed analysis of the case.

20. The twentieth part is devoted to a detailed analysis of the case.

21. The twenty-first part is devoted to a detailed analysis of the case.

22. The twenty-second part is devoted to a detailed analysis of the case.

23. The twenty-third part is devoted to a detailed analysis of the case.

24. The twenty-fourth part is devoted to a detailed analysis of the case.

25. The twenty-fifth part is devoted to a detailed analysis of the case.

26. The twenty-sixth part is devoted to a detailed analysis of the case.

27. The twenty-seventh part is devoted to a detailed analysis of the case.

28. The twenty-eighth part is devoted to a detailed analysis of the case.

29. The twenty-ninth part is devoted to a detailed analysis of the case.

30. The thirtieth part is devoted to a detailed analysis of the case.

31. The thirty-first part is devoted to a detailed analysis of the case.

32. The thirty-second part is devoted to a detailed analysis of the case.

33. The thirty-third part is devoted to a detailed analysis of the case.

34. The thirty-fourth part is devoted to a detailed analysis of the case.

35. The thirty-fifth part is devoted to a detailed analysis of the case.

36. The thirty-sixth part is devoted to a detailed analysis of the case.

On effectue une ponction pleurale de la base gauche, qui ramène un liquide contenant :

52 % de polynucléaires altérés,

48 % de lymphocytes

On demande une culture sur milieu de Loweinstein, elle s'est révélée, par la suite, négative.

T R A I T E M E N T

Devant l'augmentation de la fibrine et des α_2 , on prescrit par 24 heures :

- 6 comprimés de cortisone,
- pénicilline 2 M, streptomycine 1 g.

E V O L U T I O N :

Après quatre jours d'hospitalisation, soit quinze jours après la première manifestation de la maladie, le 26 Mai 1958 :

- la température est redevenue normale,
- le malade est moins dyspnéique,
- A l'examen, on note :
 - une diminution de l'aire de la matité cardiaque
 - un frottement nettement diminué d'intensité, il n'est plus audible que dans une zone limitée, de part et d'autre du sternum, et à la pointe.
- en arrière, à la base gauche, il existe un souffle pleurétique.

Le 28 Mai 1958, on ne retrouve plus le frottement

Le 31 Mai 1958, le malade va bien, il n'est plus gêné pour respirer, il ne souffre pas.

Le 2 Juin 1958, le malade est dans le service depuis dix jours, son état général est bon, sa température est normale, il n'existe plus aucune dyspnée, ni gêne thoracique. L'examen montre :

- un cœur sourd, une matité cardiaque encore étendue du côté droit, mais nettement diminuée au total

- le foie déborde d'un travers de main, il est légèrement douloureux, de consistance normale.

- on note encore une petite matité des deux bases, mais plus aucun signe auscultatoire de pleurésie.

Le malade reçoit du 3 au 8 Juin 1958 20 gouttes par jour de THEVINA.

Le 5 Juin 1958, le bon état général persiste, le malade prend du poids, le coeur est encore sourd. On arrête la pénicilline et la streptomycine. Le Cortencyl est diminué : de 6, on passe à 3 comprimés par 24 heures, quantité qui sera réduite de $\frac{1}{2}$ comprimé tous les deux jours.

A la radiographie, le coeur a repris son aspect normal

La vitesse de sédimentation est égale à 2

La fibrine est à 3.75 g.

L'électrocardiographie révèle

- dans les dérivations standards :
 - aplatissement de T
 - léger allongement PR en D₁
- dans les précordiales :
 - persistance de l'onde T négative en V₁ V₆

Les antistreptolysines sont à 150 U, le 23 Juin 1958

Le malade quitte le service le 24 Juin 1958

En résumé, il s'agit d'un jeune homme de 29 ans, qui présente une polysérite aiguë fébrile, à prédominance péricardique, dont il reste à préciser l'origine.

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This is crucial for developing effective interventions and policies.

2. The second part of the paper focuses on the methodological aspects of the study. It describes the data collection process, the statistical models used, and the validation procedures.

3. The third part of the paper presents the results of the study. It includes a detailed analysis of the data, highlighting the key findings and their implications for the field.

4. The fourth part of the paper discusses the limitations of the study and suggests directions for future research. It emphasizes the need for further exploration of the underlying mechanisms and the development of more robust models.

5. The fifth part of the paper provides a conclusion and summarizes the main points of the study. It reiterates the importance of understanding the underlying mechanisms and the need for further research.

DEUXIEME OBSERVATION

Monsieur C. Emile, âgé de 48 ans, entre dans le service le 15 Juin 1958 pour douleur constrictive thoraco-brachiale, avec fièvre et altération de l'état général.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Elle débute le 13 Mai 1958 par une gêne plus qu'une douleur de l'épaule gauche, n'empêchant pas les mouvements. Le lendemain, la douleur s'étend à la nuque, à l'épaule droite, elle augmente d'intensité, mais n'oblige pas le malade à interrompre son activité. Le soir, sa température est à 38°3 C.

Après une nuit calme, la température est à 37°3 C. Mais dans la journée, réapparition de la douleur siégeant dans la région rétrosternale, irradiant dans la nuque et l'épaule gauche : douleur atroce, constrictive, angoissante, avec lypothymie.

Le malade, employé de l'hôpital, est transporté dans le service.

Il n'existe aucun antécédent bacillaire, ni rhumatisme et pas d'épisode grippal, ni affection des voies respiratoires supérieures dans les jours précédant l'hospitalisation.

Amygdalectomie il y a dix ans.

Aucune crise d'angor typique.

Le seul fait marquant est l'existence d'une crise identique à celle décrite, elle a eu lieu au mois de Septembre 1957. A cette époque, des douleurs précordiales sont apparues en dehors de tout effort, de siège également variable, mais elles étaient moins intenses. Cette crise fébrile avait cédé spontanément après quelques jours de repos.

A L'EXAMEN, à l'entrée :

le 15 Juin 1958, le malade est pâle, fébrile - à 38°0 -, très dyspnéique, l'état général est altéré,

- le coeur est régulier, mais essourdi, il n'y a pas de frottement

- la tension artérielle est 11.5 - 7.5 (habituellement voisine de 15 - 8)

- il existe une matité de la base droite, avec abolition du murmure vésiculaire;

- le reste de l'examen est normal.

On institue alors un traitement : le malade reçoit de la trinitrine et une injection de chlorhydrate de morphine.

Le taux et test, demandé d'urgence, montre un sang incoagulable.

La radiographie, effectuée le 17 Juin 1958, montre :

- un coeur volumineux, triangulaire,
- un épanchement pleural de la base droite, avec un parenchyme sus-jacent, flou,
- à la base gauche, un effacement du cul-de-sac costo-diaphragmatique avec une opacité non homogène sus-jacente.

Sur l'électrocardiogramme, pratiqué le 17 Juin 1958, on lit :

- P et PR sont normaux,
- T est aplati en $D_1 - D_2 : V_2 - V_4 - V_6$
est négatif en D_3
- ST est en sur-dénivellation en $D_1, V_1 - V_6$

L'examen de sang conduit aux chiffres suivants :

- Vitesse de sédimentation, le 17 Juin 1958, : 64 - 96 - 125
- Numération globulaire : 10.000 globules blancs, dont 84 % de polynucléaires.

EVOLUTION

Trois jours après son hospitalisation, le 18 Juin 1958, la température a baissé, aux environs de 37°C, l'état général est bon, le malade ne ressent plus aucune douleur.

Sur l'électrocardiogramme du 25 Juin 1958, on note :

- l'onde T est négative en D_2, D_3 ; diaphasique en V_4, V_6
- ST est isoélectrique dans toutes les dérivations.

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs, with some lines appearing as bulleted or numbered lists. The overall structure suggests a formal document or report.]

Le 30 Juin 1958, T est aplati en D_1 , négatif en D_2

L'électrophorèse du 3 Juillet 1958 est normale.

Le taux de fibrine est de 5.80 g.

La radiographie du 2^e Juillet montre :

- un nettoyage des deux bases, avec retour à la normale des culs-de-sac diaphragmatiques
- une diminution du volume cardiaque.

Le malade allait tout à fait bien, quand, vingt-quatre jours après son admission dans le service, c'est-à-dire le 9 Juillet 1958, apparaît un clocher thermique à 38°C , qui persiste trois jours et s'accompagne d'une douleur siégeant au niveau du cou et de l'épaule gauche. Cette douleur est augmentée par la toux, les mouvements, elle n'a aucun caractère constrictif, mais elle est angoissante.

L'électrocardiogramme du 9 Juillet montre :

- un segment ST isoélectrique,
- une onde T, négative en $D_1 - D_2 - V_2 - V_4 - V_6$

Le malade reçoit du 9 juillet au 14 juillet un million de pénicilline par 24 heures.

Sept jours après la première rechute, nouvel accès de fièvre à $38^{\circ}4$ C. Le malade souffre à nouveau, il est angoissé et présente une tendance lipothymique. Ses douleurs présentent les mêmes caractères qu'auparavant.

A l'examen :

- les bruits du coeur sont normaux,
- il n'y a pas de frottement.

On institue un traitement : Auréomycine 1.50 g avec ACTH, pendant dix jours.

La radiographie du 16 Juillet 1958 montre un nouvel accroissement du volume cardiaque.

A partir du 20 Juillet 1958, quatre jours après la seconde rechute, la température devient et restera normale.

La radiographie du 21 Juillet 1958 met en évidence une diminution de l'ombre cardiaque.

La formule sanguine, le 26 Juillet 1958, présente 6.400 globules blancs (58 % de polynucléaires).

La vitesse de sédimentation, le 24 Juillet 1958, est 12 - 30 - 95.

La lecture de l'électrocardiogramme du 26 Juillet 1958 indique :

- ST est isoélectrique

- T est négatif en $D_1 - D_2$, $V_4 - V_6$

aplati en D_3

Le malade quitte le service le 3 Août 1958, en excellent état général. L'épanchement péricardique a disparu.

En résumé : péricardite aiguë, algésiogène, probablement d'étiologie virale, avec réaction pleurale, rechutes péricardiques et pleurales.

Le 22 Août 1958, de nouveau, le malade est hospitalisé dans le service.

Le 18 Août, il présentait une douleur sous-costale droite, avec des sueurs profuses, de petits frissons. La douleur persiste plusieurs jours elle est accrue par la respiration profonde et par la toux - elle est de siège variable, loin de la région précordiale, interscapulaire haute, irradiant à la partie inférieure de l'hémithorax gauche.

Le lendemain, le fièvre est à 38°C , il existe une toux quinteuse, ramenant une expectoration muco-purulente. La maison de repos où il se trouve en convalescence demande son admission.

L'EXAMEN A L'ENTREE

montre :

- un coeur assourdi, mais pas de frottement
- la présence de quelques râles à la base gauche

La radiographie - le 22 Août 1958 - permet d'observer :

- un coeur globalement augmenté de volume, triangulaire,
- un comblement du cul-de-sac costo-diaphragmatique droit et à gauche une petite opacité non homogène.

Le formule sanguine - le 22 Août 1958,

montre 9.100 gl. blancs (76 % de polynucléaires).

La vitesse de sédimentation est $73 - 103 - 125$

Deux jours après, la température est normale et le restera jusqu'à sa sortie. Les signes fonctionnels ont disparu.

La radiographie, le 26 Août 1958, est normale.

L'électrophorèse, le 25 Août 1958, montre une augmentation des α_2

La fibrine est à 8.50 g / 100

L'électrocardiogramme montre :

- un segment ST surélévation en $D_1 V_1 V_4$

- une onde T aplatie en $D_1 D_2$

 négative en D_3

- une petite onde Q_{II}

Le 28 Août 1958, les antistreptolysines sont à 80 unités

La réaction de HIRTZ est négative.

Pendant son deuxième séjour dans le service, le malade reçoit un traitement par le Cortencyl, Pénicilline et Streptomycine.

Il sort le 4 Septembre 1958 : les signes cliniques et radiologiques ont disparu; seuls persistent les anomalies électriques.

Les troubles reprennent le 8 Septembre, le malade se plaint de douleurs retrosternales, peu intenses, mais continues, avec légers paroxysmes. Il n'y a pas d'angoisse ni de strictions. La température est à $37^{\circ}3$ C.

Ces douleurs tendent à s'accroître et le 12 Septembre 1958, le malade est très dyspnéique; les douleurs siègent à droite et gauche de part et d'autre du sternum, et également dans la région interscapulaire et au niveau des muscles de la nuque. La température est à $38^{\circ}C$, elle redescend à $37^{\circ}C$ le lendemain.

Le malade a reçu de la Pénicilline et de la streptomycine à partir du 10 Septembre.

Les douleurs ne cèdent pas, la dyspnée persiste, le malade tousse et émet des crachats muco-purulents.

Le 15 Septembre, la température atteint $39^{\circ}C$ et le malade revient dans le service le 16 Septembre 1958.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = R(x, y, z),$$

where P, Q, R are continuous functions of x, y, z in a certain domain D of the three-dimensional space, and x, y, z are the coordinates of the point M in D .

It is well known that the system of equations (1) has a solution in D if and only if the functions P, Q, R satisfy the conditions

$$P^2 + Q^2 + R^2 > 0 \quad \text{in } D,$$

$$P = Q = R = 0 \quad \text{in } D,$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{dQ}{dt} = \frac{dR}{dt} = 0 \quad \text{in } D,$$

where $\frac{dP}{dt}, \frac{dQ}{dt}, \frac{dR}{dt}$ are the derivatives of P, Q, R with respect to t .

It is also well known that the system of equations (1) has a solution in D if and only if the functions P, Q, R satisfy the conditions

2. The second part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

where P, Q, R are continuous functions of x, y, z in a certain domain D of the three-dimensional space, and x, y, z are the coordinates of the point M in D .

It is well known that the system of equations (2) has a solution in D if and only if the functions P, Q, R satisfy the conditions

3. The third part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

where P, Q, R are continuous functions of x, y, z in a certain domain D of the three-dimensional space, and x, y, z are the coordinates of the point M in D .

It is well known that the system of equations (3) has a solution in D if and only if the functions P, Q, R satisfy the conditions

4. The fourth part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

A L'EXAMEN, à l'entrée :

Le 16 Septembre, l'état général du malade est bon, la fièvre est à 39°C, il existe une douleur discrète sus-mamelonnaire déclenchée par la respiration profonde.

L'examen cardio-vasculaire montre une matité cardiaque qui ne paraît pas élargie, la pointe n'est pas perçue, les bruits sont normaux, il n'y a pas de frottement.

La Tension artérielle est à 13 - 8.

Le reste de l'examen est normal.

Radiographie du 10 Septembre 1958 - de ville - met en évidence l'épanchement périocardique en montrant un gros cœur.

L'électrocardiogramme - le 16 Septembre 1958 - permet d'observer :

- une onde T négative en D₁ D₂

La formule sanguine indique 7.600 globules blancs (58 % de polynucléaire).

Devant l'allure trainante de cette périocardite, on demande un examen des crachats, le 16 Septembre 1958, pas de bacilles de KOCH après homogénéisation.

La radiographie, le 16 Septembre 1958, montre une diminution de l'épanchement périocardique, mais le cœur reste encore volumineux

Pendant son troisième séjour dans le service, Monsieur C ... reçoit un traitement de Terramycine et d'A.C.T.H.

Il sort le 27 Septembre 1958.

D I A G N O S T I C : Péricardite aiguë algésiogène, probablement d'étiologie virale, chez un homme de 48 ans, ayant présenté en quatre mois quatre rechutes dont deux sous traitement, complications pleurales associées.

+

+

+

7

1890

[illegible]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed script. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.

Les difficultés que nous avons rencontrées devant ces deux malades ont attiré notre attention sur le problème diagnostique des Péricardites.

Tous les travaux cardiologiques récents insistent sur la fréquence et la variété des affections péricardiques. L'observation d'une fréquence accrue de ces affections actuellement tient à ce qu'elles sont mieux connues et surtout au fait que des moyens de diagnostic plus précis sont à notre disposition.

Cependant, malgré les techniques nouvelles d'exploration, l'existence d'une Péricardite reste souvent méconnue, et lorsqu'elle est identifiée, même avec l'étude la mieux conduite, son étiologie peut être difficile à préciser.

Le diagnostic positif - comme étiologique - des Péricardites reste donc un problème difficile.

HISTORIQUE

- L'existence des Péricardites avait été reconnue par GALIEN, puis par MORGAGNI
 - LAENNEC et CORVISART avaient vu la nature tuberculeuse de certaines d'entre elles.
 - Avec SENAC, on obtient les premières descriptions fonctionnelle et clinique.
 - AUENBRUGGER, en 1760, montre l'intérêt de la percussion.
 - COLLIN, en 1824, décrit les frottements péricardiques, dont BOUILLEAUD, plus tard, soulignera la valeur séméiologique.
 - Dès 1912, CYBULSKI et SURZYKI notent une diminution de l'amplitude de R, un aplatissement de T.
 - En 1929, description et explication pathogénique : Robert LEVY, PORTE et CORDEL, BARNES, SCOTT, FEIL et KOTZ.
 - En 1935, HOLZMANN décrit les quatre périodes de l'évolution électro-cardiographique des Péricardites aiguës qui sont confirmées par les études de WINTERNITZ et LANGENDORF en 1938.
 - En 1940, paraissent les premières études des altérations électriques en dérivations précordiales : WORTH et BARNES, BELLET et Mac MILLAN, WANDER VEN et NORRIS, GROEDAL.
 - En 1941, important travail de COELHO.
 - En 1951, paraît la thèse de CASTEL.
 - Pour terminer, il faut aussi rappeler les travaux récents de BARNES et BURCHELL; en 1942, de CARMICHAEL, de NAY et BOYER, sur les Péricardites aiguës d'étiologie indéterminée.
 - En France, nous avons les travaux de DONZELOT, CASTEL et HUSSON, BESTAUX, BOUVRAIN et COSTEAS, COBLENTZ, FUNCK BRENTANO et LENEGRE, CASTEL et COLVEZ, DROUET FAIVRE et LAMY
-

DIAGNOSTIC DES PERICARDITES

Ce diagnostic s'appuie sur :

des données cliniques,
radiologiques,
électriques

et éventuellement sur la ponction du péricarde.

1.- Données cliniques

Au stade de la Péricardite sèche, c'est essentiellement un problème clinique. En dehors des signes fonctionnels, souvent révélateurs mais inconsistants et dont la douleur est le plus important, le seul signe est un signe d'auscultation : le frottement péricardique.

C'est un bruit superficiel, à timbre de frottement variable, allant du froissement léger de la soie au bruit rugueux de crissement de cuir neuf. Il est "à cheval" sur les bruits du cœur.

Il ne siège pas à un foyer classique d'auscultation, souvent mésocardique endoapexien, au troisième espace intercostal gauche. Il ne se propage pas, "il naît et meurt sur place". Enfin, il est variable, suivant la pression du stéthoscope, la position du malade et d'un jour à l'autre.

Au stade de la Péricardite avec épanchement, c'est la radiologie qui est le meilleur moyen de diagnostic; le diagnostic clinique est souvent délicat.

Les signes physiques sont alors les éléments les plus valables de diagnostic.

- Si le frottement péricardique est le symptôme majeur des péricardites sèches, pourtant il est souvent entendu au cours des Péricardites exsudatives de moyenne et de faible abondance. On l'entend à la limite supérieure de l'épanchement.

Sa disparition au cours d'une péricardite sèche doit attirer l'attention et faire craindre un épanchement, mais on sait son extrême variabilité.

Sa durée pouvant aller de quelques heures à quelques jours, il peut, par ailleurs, facilement passer inaperçu ou ne pas être retrouvé au cours d'exams successifs : ce qui peut mettre en doute son existence réelle.

Quand il est typique, sa présence affirme le diagnostic, mais parfois celui-ci pourra être difficile avec un souffle artificiel ou un souffle extra-cardiaque.

- Il existe une seconde manifestation qui pourrait permettre le diagnostic, mais elle n'est pas facile à mettre en évidence : c'est l'élargissement de la matité cardiaque.

Certes, la recherche de l'augmentation de l'aire de la matité cardiaque a perdu de son intérêt depuis la possibilité d'examen radiologiques, mais ceux-ci cependant ne lui enlèvent pas toute sa valeur.

Il est vrai également que souvent on ne pensera à la déterminer que lorsqu'un cliché thoracique aura attiré l'attention sur un cœur un peu gros.

Dans les grands épanchements, cette matité déborde à droite le bord droit du sternum, à gauche, la ligne mamelonnaire; elle s'étend également vers le haut. On lui a décrit différents caractères qui la différencieraient de celles que donnent les cœurs dilatés, en réalité, ces caractères n'ont pas un grand intérêt pratique.

- A côté de ces deux symptômes majeurs, on pourra aussi mettre en évidence une disparition ou une diminution du choc de la pointe et un assourdissement des bruits du cœur, mais cet assourdissement est peu révélateur, il peut, par exemple, être dû à une endocardite ou à une myocardite.

Si les signes physiques sont des éléments qui permettent de porter un diagnostic rapide, parfois, ils pourront être trompeurs et conduire à un diagnostic erroné de pleurésie ou de pneumonie. Le syndrome de Pin simule en tous points une pleurésie de la base gauche, mais il ne s'observe guère que chez l'enfant et disparaît d'ailleurs en position genu-pectorale; et au cours d'un épanchement péricardique, il existe à l'angle de l'omoplate gauche une matité, une respiration type bronchique et une augmentation des vibrations vocales qui évoquent la pneumonie (EWART).

A côté de cette symptomatologie commune à toutes les péricardites, il existe des signes fonctionnels ou généraux qui dépendent de leur étiologie et quelquefois la péricardite sera annoncée par ces signes.

Les signes généraux sont les moins significatifs : anorexie, asthénie, amaigrissement, fièvre, sont des symptômes banaux, retrouvés dans toute autre affection et de plus, ils sont inconstants. Mais, devant leur existence, lorsque rien ne peut venir les justifier, il faudra penser à reconnaître les signes de début d'une péricardite aiguë.

Les signes fonctionnels dans la plupart des cas sont bien plus importants et dépendent beaucoup de l'étiologie et plus encore de la rapidité et de l'abondance de l'épanchement.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

La douleur peut revêtir différents aspects tant dans son type que dans sa topographie, soit simple gêne thoracique ou névralgie intercostale gauche exagérée par la toux, ou douleur à projection épigastrique pseudo-abdominale, ou enfin et surtout, comme dans notre dernière observation : douleur angineuse, constrictive, rarement continue - elle est en règle intermittente - avec irradiation vers la partie gauche du cou, vers les poignets.

En ce qui concerne cette douleur, un caractère assez spécial à la péricardite est son exagération par l'inspiration forcée et le moindre mouvement, : le malade atteint de péricardite et qui souffre est un malade immobile.

La dyspnée peut devenir considérable, son intensité ayant justifié les descriptions classiques.

Il existe d'autres signes fonctionnels révélateurs, liés également à la compression, mais ils sont rarement observés qu'ils soient : troubles vocaux par paralysie récurrentielle gauche, ou dysphagie, ou hiccot, ou toux.

On voit combien il est difficile d'affirmer cliniquement l'existence d'une péricardite : en effet, si les signes physiques sont pathognomoniques, ils sont bien souvent difficiles à mettre en évidence; quant aux autres, ils ne sont pas univoques et peuvent être trompeurs, si bien que la radiologie et l'électro-cardiographie sont indispensables pour porter le diagnostic.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

2.- Données Radiologiques

L'examen radiologique viendra :

- soit confirmer un diagnostic évoqué cliniquement,
- soit révéler un épanchement.

A l'examen radioscopique, on verra une ombre cardiaque volumineuse, développée transversalement, dont les bords sont très peu battants ou immobiles. Le pédicule vasculaire est court, mais, signe important, il bat normalement, alors que, dans le gros coeur par dilatation, il reste immobile.

Le cliché montrera un coeur volumineux, mais c'est la confrontation d'images successives qui, en révélant les variations de volume de l'ombre cardiaque au cours de la maladie, est finalement le signe le plus intéressant.

L'examen radiologique enfin pourra montrer l'existence de complications pleura-pulmonaires associées.

1874

1874

1874

1874

1874

1874

1874

1874

3.- Données Electriques

L'examen électrocardiologique n'a pas la valeur de l'examen radiologique, mais il reste cependant indispensable; l'étude des tracés électriques apporte des arguments sérieux de diagnostic.

Nous n'oublierons pas l'existence fréquente d'un décalage entre la traduction électrique et la séméiologie clinique, d'où la nécessité d'enregistrements successifs.

Deux principales anomalies évoquent le diagnostic de Péricardite :

- 1° - le bas voltage de Q R S, classique mais semblant rarement observé dans les péricardites aiguës;
- 2° - les altérations du segment ST et de l'onde T dont le caractère majeur est la concordance dans la plupart des dérivations.

L'altération de ST est précoce, elle disparaît rapidement, dure 15 jours environ. Elle consiste le plus souvent en une surélévation. Quelquefois le décalage de ST peut se faire vers le bas, ce qui serait en faveur de l'étiologie tuberculeuse de la Péricardite.

L'altération de T, plus tardive, est plus durable, elle peut subsister plusieurs mois.

Ces anomalies semblent évoluer en quatre stades :

- dans un premier stade : décalage de ST, l'onde T reste lisible
- dans un deuxième stade : le segment ST rejoint sa ligne de base; l'onde T commence à marquer une tendance à la négativité
- dans un troisième stade : le segment ST isoélectrique devient courviligne à concavité supérieure ; T est négatif dans toutes les dérivations.
- dans un quatrième stade : repositivité de T et retour à la normale

L'électrocardiogramme peut, en plus des altérations caractéristiques des Péricardites, présenter d'autres anomalies qui seront utiles pour le diagnostic étiologique.

- un allongement de PR se voit dans la Péricardite rhumatismale
- dans la Péricardite tuberculeuse, le décalage de ST se fera vers le bas, alors que dans les péricardites rhumatismale et aiguë bénigne, nous noterons une sus-dénivellation.

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and focus groups.

3. The next section presents the results of the study, showing that there is a significant correlation between the variables being studied.

4. Finally, the paper concludes by discussing the implications of the findings and suggesting areas for further research.

5. The authors also provide a list of references and a table of contents for the full report.

6. The paper is well-written and easy to read, with clear headings and subheadings.

7. The data is presented in a clear and concise manner, making it easy to understand.

8. The conclusions are well-supported by the data and are presented in a logical and coherent manner.

9. The paper is a valuable contribution to the field and is highly recommended for reading.

10. The authors have done a great job of presenting their findings and are to be commended for their work.

11. The paper is a well-written and informative piece of research that is highly recommended for reading.

12. The authors have done a great job of presenting their findings and are to be commended for their work.

4.- Opportunité de la Ponction du Péricarde

Avec les données cliniques et l'aide de la radiographie et de l'électrocardiographie, nous arrivons en général à poser le diagnostic de Péricardite. Mais il n'existe pas de signe de certitude de Péricardite en dehors de la ponction. C'est le seul moyen qui permette de faire un diagnostic de péricardite de façon infaillible.

Elle apporte non seulement la preuve de l'affection mais également la preuve étiologique.

Rappelons seulement qu'elle ne doit pas être systématique ni devenir un procédé de diagnostic courant, des accidents étant imprévisibles.

Elle garde toute sa valeur lorsqu'elle devient un moyen thérapeutique. La ponction évacuatrice peut se montrer indispensable dans la péricardite tuberculeuse.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

I.- Les formes douloureuses conduisent à discuter :

- a.- une embolie pulmonaire dans sa forme angineuse, le problème se complique et le diagnostic différentiel s'en trouve d'autant plus délicat que l'apparition d'une péricardite réactionnelle au cours d'une embolie pulmonaire est possible,
- b.- L'infarctus du myocarde, dont le diagnostic se pose de façon sigue, tant du point de vue thérapeutique que pronostic surtout.

II.- Les formes avec dyspnée et gros coeur feront discuter :

- une dilatation cardiaque.
L'élimination sera d'autant plus difficile qu'il peut exister dans la péricardite :
- un retentissement vasculaire périphérique pouvant évoquer une insuffisance cardiaque globale;
- une atteinte du myocarde, en relation avec l'épanchement péricardique.

III.- Les formes avec dyspnée et douleur thoracique conduiront à éliminer :

- a.- Un pneumothorax spontané;
 - b.- Une pneumopathie siguë;
 - c.- Une pleurésie aigue; diagnostic différentiel rendu délicat par l'existence, soit d'un syndrome p.e.u.o - pleurétique, soit d'une pleurésie vraie.
-

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE DES PERICARDITES

L'épanchement péricardique reconnu, il faut en établir la nature. Il est souvent plus difficile de préciser le diagnostic étiologique d'une Péricardite que d'en établir le diagnostic positif, surtout si la Péricardite est isolée.

L'allure évolutive, les examens paracliniques, l'interrogation sont un très grand appoint.

Les Péricardites purulentes aiguës représentant une variété rare de Péricardites aiguës infectieuses elles posent surtout des difficultés de diagnostic. positif, la ponction du péricarde révèle la nature de l'épanchement.

Nous discuterons donc essentiellement la péricardite tuberculeuse, la péricardite rhumatismale, et la péricardite aigue bénigne.

I. - LA PERICARDITE TUBERCULEUSE : On recherchera attentivement tous les signes en faveur de l'étiologie tuberculeuse.

L'interrogatoire aura pour but de retrouver une maladie émergeante récente, une notion de contact, des signes d'imprégnation tuberculeuse, une primo-infection antérieure, une bacillose actuelle.

Au cours d'un examen complet du malade, on essaiera de découvrir une lésion tuberculeuse latente.

Le caractère de l'épanchement, par son importance, sera lui-même un argument de diagnostic.

L'électrocardiogramme en dehors des anomalies habituelles, bas voltage, aplatissement et négativité de T, montre qu'il n'y a pas de surdénivellation de ST. On a un décalage vers le bas et si quelquefois le décalage peut se faire vers le haut, au cours de l'évolution, très vite, on observera une sous-dénivellation. Ces anomalies se retrouvent dans toutes les dérivations standards et dans les précordiales gauches V_4 V_6 .

Mais la ponction du péricarde est indispensable; c'est l'étude du liquide qui permettra de faire la preuve de l'étiologie tuberculeuse. L'aspect immédiat : liquide riche en albumine, lymphocytose élevée, oriente déjà le diagnostic.

Le pneumopéricarde que l'on pourra créer lors de la ponction permet de constater l'existence d'un péricarde pariétal épaissi, irrégulier. Ceci est un argument de valeur en faveur de la nature bacillaire de l'épanchement.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

LONDON

Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, near the North Gate

1679

THE HISTORY OF THE REIGN OF CHARLES THE FIRST, BY JOHN BURNET, OF THE UNIVERSITY OF OXFORD. IN TWO VOLUMES. LONDON, Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, near the North Gate. 1679.

THE HISTORY OF THE REIGN OF CHARLES THE FIRST, BY JOHN BURNET, OF THE UNIVERSITY OF OXFORD. IN TWO VOLUMES. LONDON, Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, near the North Gate. 1679.

THE HISTORY OF THE REIGN OF CHARLES THE FIRST, BY JOHN BURNET, OF THE UNIVERSITY OF OXFORD. IN TWO VOLUMES. LONDON, Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, near the North Gate. 1679.

Mais il n'est pas toujours facile de faire la preuve de la nature tuberculeuse de la Péricardite en attendant la preuve irréfutable donnée par l'analyse du liquide de ponction : bacille de Koch à l'examen direct, culture sur milieu de Lowenstein, inoculation au cobaye.

Il existe, en effet, des formes pseudo-angineuses de Péricardites tuberculeuses; elles sont rares, mais elles posent un problème et conduisent à éliminer une Péricardite aigue bénigne. De plus, péricardite tuberculeuse et péricardite rhumatismale s'opposent, mais il est des cas - notamment lors de Péricardite isolée primitive - où l'hésitation persiste jusqu'aux résultats des examens du liquide de ponction, qui viendront lever le doute.

II.- LA PERICARDITE RHUMATISMALE

Si la péricardite survient au décours d'une crise typique de Rhumatisme Articulaire Aigu, aucun doute n'est permis sur l'étiologie, mais si l'on est devant une péricardite isolée commune, comme c'est le cas dans notre première observation, on recherchera :

- des antécédents rhumatismaux,
- des séquelles valvulaires.

Si l'interrogatoire, l'examen du malade ne peuvent fournir aucun argument étiologique, on se basera alors sur :

- une augmentation de la vitesse de sédimentation,
- une hyperfibrinémie,
- une augmentation de α_2
- un taux élevé des antistreptolysines,
- la présence de streptocoques hémolytiques dans la gorge,
- la modification de la formule sanguine.

Mais aucun de ces signes biologiques ne permet d'affirmer de façon certaine l'étiologie rhumatismale. La fibrine peut être augmentée dans la Péricardite aigue bénigne (DONZELOT le cite dans deux cas sur six) et il est des taux d'anti-streptolysines normaux au cours de maladie de BOUILLAUD typique.

Cependant, il est exceptionnel qu'une Péricardite rhumatismale soit isolée, elle est presque constamment associée à une endo ou à une myocardite. L'électrocardiogramme montrera alors, outre les anomalies de ST et de T, un allongement de PR : cet allongement traduit la participation du myocarde.

En résumé, une fibrine augmentée, des α_2 et un taux d'antistreptolysines élevé, un allongement de PR, un gros foie et des oedèmes qui objectivent

une atteinte du myocarde, l'apparition de souffle d'endocardite plaident en faveur de l'origine rhumatismale; la rapide rétrocession de tous ces signes sous l'influence du Cortancyl peut encore être un argument supplémentaire.

Mais il est des cas de Péricardite isolée, primitive, où l'incertitude demeure.

" Une Péricardite rhumatismale survenant comme premier signe d'une
" crise de rhumatisme articulaire aigu peut être impossible à différencier d'une Péricardite aiguë non spécifique tant qu'une
" localisation articulaire ou endocarditique n'est pas venue résoudre le problème. Il n'est pas interdit de se demander si
" certaines observations de Péricardite aiguë non spécifique n'étaient pas en réalité des formes anarticulaires de la maladie
" de BOUILLAUD."

(BOUVRAIN, FRIDOS et COSTEA)

Lorsqu'on ne retrouve aucune manifestation articulaire, aucune manifestation cardiaque, aucune chorée, aucun érythème rhumatismal, aucun nodule de MAYNET, qui sont les signes principaux de la maladie, on établira le diagnostic sur des signes de présomption : myalgie, douleurs articulaires à la fatigue, notion d'épidémie, angines récentes, signes biologiques, caractère de l'épanchement, qui, en général, est peu abondant, sans attendre des signes de certitude comme l'apparition, par exemple, dans les semaines qui suivront la Péricardite, d'une Cardite.

Si l'on veut traiter les malades avant l'apparition des cardiopathies, il faut établir le diagnostic sur des signes de présomption.

III.- LA PERICARDITE AIGUE BENIGNE

Troisième étiologie à envisager. S'observe actuellement avec la même fréquence que la Péricardite tuberculeuse, après la Péricardite rhumatismale.

Elle possède des caractères assez particuliers et le diagnostic différentiel se pose avec l'Infarctus du myocarde.

Parfois, on trouve dans les jours précédents des signes d'affection bénigne des voies aériennes supérieures ou l'existence d'une grippe.

Le début est brutal, il survient généralement chez un sujet jeune, mais en fait, nous savons que si la péricardite aiguë bénigne frappe des adultes jeunes, elle peut exister chez des sujets plus âgés, ainsi :

- CARMICHAEL, sur 50 cas, trouve 18 malades âgés de plus de 40 ans,
- BARNS et BURCHEL ont indiqué une moyenne de 42 ans pour 14 malades.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Si la douleur dans la Péricardite aigue bénigne, dans son ensemble, paraît analogue à celle de l'infarctus, elle possède cependant quelques caractères qui lui sont propres.

La douleur peut être épigastrique, et son intensité telle qu'elle peut faire envisager une intervention abdominale comme cela se voit également dans certains infarctus à symptomatologie digestive.

Le plus souvent, elle est thoracique et parmi les caractères importants qui s'opposent à ceux de la douleur de l'infarctus, on note qu'elle est à type de blocage respiratoire, qu'elle est augmentée par la respiration, par la toux, calmée par le repos et l'immobilité, qu'elle ne recède pas sous l'action de la trinitrine."

Cette douleur s'accompagne de fièvre élevée, signe important, elle est constante, et surtout immédiatement contemporaine de la douleur, alors que, dans l'occlusion coronarienne, elle n'apparaît que vers le second ou le troisième jour.

Le frottement dans la Péricardite aigue bénigne n'est pas toujours retrouvé :

- pour BULTINCK, il peut être absent une fois sur quatre;
- BARNES, en 1942, cite l'absence de frottement dans 8 cas sur 14;
- MAY et BOYER notent cette absence dans 4 cas sur 15;
- LOGUE et WENDEDS notent cette absence dans 9 cas sur 17.

Il demande à être recherché soigneusement, cependant, quand il existe dans la Péricardite de ce type, il est intense, apparaît tôt et s'étend sur une grande surface de l'aire précordiale. Dans l'infarctus, il est rare, fugace, plus tardif.

La Radiographie, dans notre observation, montre une nette augmentation du volume cardiaque, et l'existence d'un épanchement pleural droit.

Il est fréquent d'observer, associé à la Péricardite aigue bénigne, soit une pneumopathie à virus, soit un épanchement uni ou bilatéral.

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

1870-1871
 1870-1871
 1870-1871

- EVANS, sur 8 observations : 2 pneumopathies atypiques;
- SOLFF, en 1943, sur 5 observations : 3 pneumopathies atypiques;
- 3 cas de FINKELSTEIN et KLAINES en 1942 en sont trois autres exemples.

L'atteinte pleuro-pulmonaire est un élément d'appoint pour le diagnostic des Péricardites.

Le volume du coeur, pour les uns est peu modifié; pour les autres, augmenté : ceci s'expliquerait par le fait qu'il existe des formes sèches, et des formes avec épanchement.

Dans l'infarctus, l'image cardiaque peut être agrandie.

L'électrocardiogramme montre les anomalies caractéristiques des Péricardites, altération de ST et de T, mais c'est dans cette forme qu'apparaît le plus nettement l'évolution en quatre stades.

C'est l'électro-cardiogramme, examen essentiel, capital, qui permet le plus souvent d'éliminer le diagnostic de thrombose coronarienne.

- Dans la Péricardite, on a un décalage supérieur de ST, léger, à concavité supérieure, n'englobant pas l'onde T. Décalage concordant en deux ou trois dérivations standards. L'inversion de l'onde T n'a jamais l'amplitude de celle observée dans l'infarctus.

- Dans l'infarctus : surdéniivellation importante de ST, à convexité supérieure, englobant l'onde T. Discordance des anomalies en première et troisième dérivations. Onde T négative mais très ample, pointue et symétrique, avec discordance en première et troisième dérivations. Enfin, existe l'onde Q de rétrose.

Mais on peut observer des ondes T négatives dans trois dérivations standards, lors d'une ischémie sous-endocardique antérieure.

Une péricardite survenant sur un coeur en dextro rotation peut simuler un infarctus postérieur en raison de l'onde Q₃. Mais, fait important, ces altérations sont de courte durée et les tracés électriques sont normaux lors de la guérison d'une Péricardite, il n'existe aucune séquelle, à l'inverse de l'infarctus.

Quelquefois, malgré les renseignements fournis par la clinique, la Radiographie et l'électrocardiographie, le diagnostic entre Péricardite et Infarctus est délicat, l'évolution bénigne de la Péricardite permet un diagnostic au moins rétrospectif et reste un argument essentiel.

L'existence de complications pleurales et veineuses associées est fréquente; elles peuvent survenir d'emblée avec la Péricardite ou au cours des rechutes; elles sont un élément d'appoint pour le diagnostic.

Deux particularités au cours de son évolution :

1° - La fréquence des rechutes :

- 6 cas sur 10 pour EVANS; 9 pour CARMICHAEL; 3 sur 5 pour DONZELOT et CASTEL.
- Ces rechutes peuvent être nombreuses : 4 rechutes en 4 mois au cours de notre observation.

2° - L'évolution bénigne spontanément et sans séquelles.

Les réactions spécifiques des viroses, l'examen cyto bactériologique du cavum seront intéressantes à demander.

Malgré ses caractères particuliers, il est des cas où son diagnostic avec celui de Péricardite tuberculeuse ou rhumatismale reste difficile, non pas lorsque ces dernières s'observent au milieu soit d'un tableau de tuberculose, soit d'une maladie de BOUILLAUD, mais lorsqu'on est en présence d'une Péricardite isolée primitive.

L'élimination de l'origine tuberculeuse sera délicate, les données cliniques n'offrent guère de différences, les examens de laboratoire seront ici d'un appoint précieux, l'électrocardiogramme fournira également des arguments sérieux pour le diagnostic :

- " Le décalage supérieur de ST si fréquent dans les Péri-
- " cardites d'étiologie indéterminée n'a jamais été rencon-
- " tré dans les Péricardites tuberculeuses"

(COALHO, CASTEL)

Nous avons vu, lorsque nous avons abordé la péricardite d'origine rhumatismale, les difficultés qui existaient pour poser un diagnostic différentiel entre elle et la Péricardite aigue bénigne.

Parfois, rien de décisif ne permet d'écarter l'origine rhumatismale. L'absence d'atteinte des autres tuniques cardiaques plaidera en faveur de la Péricardite aigue bénigne; il est rare même au cours d'une Péricardite rhumatismale bien traitée qu'il n'existe pas une séquelle endocardique, alors que l'examen cardiaque après une Péricardite aigue bénigne reste négatif.

Les difficultés de diagnostic positif tiennent dans le fait que, trop souvent, l'on ne pense pas au diagnostic de Péricardite d'une façon systématique.

" Si vous comptez sur des symptômes évidents, neuf fois sur dix, vous méconnaîtrez l'épanchement du péricarde "

(JACCOUD)

" Peu de maladies peuvent aussi facilement passer inaperçues que les péricardites "

(VAQUEZ)

La Radiologie et l'Electrocardiographie sont des examens d'un intérêt capital. La Radiologie est le meilleur moyen de diagnostic d'un épanchement péricardique.

Leur diagnostic étiologique, si l'on s'en tient au schéma classique, semblerait présenter peu de difficultés. Pourtant, dans le cas où le diagnostic s'impose, il reste parfois impossible de déterminer la cause de la Péricardite. Les deux cas observés par nous récemment mettent en évidence les difficultés que l'on peut rencontrer au cours de péricardite aiguë, même lorsque l'on a su en reconnaître l'existence.

Dans notre première observation, l'augmentation de la matité cardiaque, le frottement, nous font porter le diagnostic de péricardite, mais quelle en est l'origine ? Nous avons écarté l'étiologie tuberculeuse sur la clinique, l'électrocardiogramme. Les résultats négatifs de l'examen du liquide de la ponction sont venus confirmer la nature non bactérienne de cet épanchement. Le choix demeurait entre Péricardite Rhumatismale et Péricardite aiguë bénigne. L'absence de tout signe de localisation rhumatismale, les nombreux éléments négatifs nous ont fait hésiter sur la nature rhumatismale de cette péricardite, mais l'augmentation des α_2 et de la fibrine nous ont empêchés d'écarter complètement cette étiologie, et en raison de ces résultats, un traitement par le Cortanoyl a été institué.

En ce qui concerne notre deuxième observation, en raison de l'âge du malade, de la topographie des douleurs et leurs caractères, de l'absence de

frottement, de l'assourdissement des bruits du coeur, de la chute de tension et de la tendance au collapsus, on pouvait cliniquement au moins évoquer un infarctus du myocarde.

Le fait que la symptomatologie ait permis de porter le diagnostic d'infarctus, diagnostic redressé dans les jours qui ont suivi, oriente fortement sur la nature de la péricardite. L'électrocardiogramme, les examens biologiques, les quatre rechutes au cours de l'évolution, l'évolution bénigne ont confirmé notre diagnostic de Péricardite aigue bénigne. De quelle étiologie ? Probablement virale, mais nous n'en avons pas la preuve. Un argument en faveur de cette étiologie est l'existence d'épisode pneumonique fugace, mais nous n'avons pas effectué de réactions des agglutinines froides. La réaction de HIRZ est négative, mais il semble qu'elle ait été rarement trouvée positive (1 cas : DONZELOT). Certaines péricardites aigues bénignes sont d'étiologie connue, elles accompagnent des affections définies, mais la plupart sont isolées et alors trois hypothèses étiologiques sont discutées : origine microbienne, allergique ou virale. Cette dernière recueille le plus de suffrages.

Nous avons cru intéressant de rapporter ces deux observations; elles montrent bien les difficultés du diagnostic étiologique des Péricardites. Il est parfois impossible de fixer la nature d'un épanchement, ce qui est pourtant d'un grand intérêt pronostic sûrement, mais thérapeutique essentiellement. Nous insisterons sur la grande importance de l'électrocardiogramme dans le diagnostic étiologique des Péricardites,

- le trouble de PR est presque pathognomonique de l'étiologie rhumatismale, n'ayant été rencontré que rarement dans les autres péricardites.
- le décalage supérieur de ST n'a jamais été rencontré dans les Péricardites tuberculeuses (COELHO).

Les examens bactériologiques sont de peu d'intérêt, tout au moins immédiat, or, on sait l'importance d'un diagnostic étiologique précoce qui permettra une thérapeutique rapide.

La clinique, les examens biologiques répétés, l'allure évolutive de la maladie sous l'effet du traitement, l'électrocardiogramme permettront de faire pencher en faveur de telle ou telle étiologie. Mais toutes les fois que ni tuberculose, ni une affection microbienne déterminée ne sont pas en cause nettement, il faudrait faire un traitement salicylé de sécurité (PERRIN).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF CHEMISTRY
FOR THE YEAR 1904
BY
J. H. MANNING
CHIEF OF BUREAU

CHICAGO
PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1905

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILL.

CHICAGO
PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1905

CHICAGO
PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1905

C O N C L U S I O N S

- 1° - Les Péricardites sont des affections sévères et leur diagnostic est souvent difficile. La radiologie et l'électrocardiographie constituent des examens d'un intérêt capital. Ils sont indispensables pour assurer le diagnostic des Péricardites.
- 2° - Le diagnostic étiologique des Péricardites, si l'on s'en tient aux schémas classiques, semblerait présenter peu de difficulté. Toutefois, reconnaître la nature de l'épanchement n'est pas toujours simple et soulève des problèmes ardu. Il est des cas de Péricardites où l'incertitude sur leur étiologie demeure.
- 3° - L'apparition de la Péricardite Aiguë Bénigne constitue une donnée récente. Cette forme présente des particularités cliniques, électriques et évolutives. Le diagnostic différentiel se pose cependant avec les autres péricardites aiguës et surtout avec l'infarctus du myocarde.

V U & P E R M I S D ' I M P R I M E R 1

Le RECTEUR de l'ACADEMIE de PARIS :

J. S A R R A I L H

Le DOYEN de la FACULTE de MEDECINE
de PARIS :

L. B I N E T

Le président du Jury de Thèse :

D E P A R I S

THE HISTORY OF THE

1

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

B I B L I O G R A P H I E

BOUVRAIN Y. et COSTEAS F.

Les péricardites aiguës non spécifiques

Presse-Médicale, 24 Mai 1952

BULTINCK G.

Contribution à l'étude des Péricardites aiguës bénignes
autonomes

Thèse PARIS 1953, N°877

DONZELOT E., CASTEL Y et HUSSON R.

Péricardites aiguës d'origine indéterminée

Semaine des Hôpitaux, PARIS, 2 Mai 1952, n°33

DONZELOT E.

Les Péricardites aiguës bénignes

Revue du Praticien, Fév. 1955, n°4

DROUET D.L., FAIVRE G. et LAMY P.

La Péricardite aigue bénigne

Concours Médical 19 Juin 1954

BENHAMOU Ed., E. ALBOU et J. LAABSAN

La Péricardite tuberculeuse de l'adulte

Archives des Maladies du coeur et des vaisseaux
N°10 - Oct. 1954

1900

January 1st

Dear Sir

I have the honor

Yours faithfully

Wm. L. G. & Co.

1900

January 1st

Dear Sir

I have the honor

Yours faithfully

Wm. L. G. & Co.

1900

I have the honor

Yours faithfully

Wm. L. G. & Co.

1900

January 1st

Dear Sir

I have the honor

Yours faithfully

1900

CASTEL Y.

La Péricardite aigue bénigne

Gazette Médicale, 8 Juin 1956

L. LAPLANCHE

Péricardite tuberculeuse - Quelques précisions actuelles -

Gazette Médicale - 2 Juin 1956

R. RULLIERE

Diagnostic des Péricardites aigues

Gazette Médicale - 2 Juin 1956

MOUQUIN

Semeiologie générale des Péricardites

Revue du Praticien, 1^{er} Février 1955

BOUREL

Péricardite rhumatismale

Revue du Praticien, Février 1955

DESCHAMPS

Péricardite tuberculeuse

Revue du Praticien, Février 1955

BARN et BURCHEL

Acute pericarditis simulating acute coronary occlusion
A report of fourteen cases

American Heart J. 1942

FORTIN

Bulletin Médical N°23, Déc. 1952

Péricardite aigue non spécifique

PERRIN

Difficulté de diagnostic étiologique des Péricardites

Quest Médical 10 Avril 1954

EVANS E.

Péricardite aigue bénigne non spécifique

J. Am. Méd. ass. 15 Juillet 1950

LELIEVRE H.G.L.

Contribution à l'étude des Péricardites aigues bénignes,
dites à virus

Thèse PARIS 1956, N°197

LEMOINE

Contribution à l'étude des Péricardites aigues bénignes

Thèse PARIS, 1954, N°956

LOGUE R. WENDKOS M.

Péricardite aigue de type bénin

Am. Heart J. Octobre 1948

NAY M. et BOYER H.

La Péricardite aigue chez les adultes jeunes

Am. Heart J. Août 1946.

to the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

